

Hydroponically grown fodder is a cost-effective easy to produce and very beneficial for livestock. Liwal Waşgar L1 feed system produce essential, healthy and fresh feed in nearly seven days.

Fodder Benefits

Fodder grown in a Liwal Waşgar L1 Feed System mimics the benefits of fresh pasture and is a more appropriate feed option for grazing animals. They are able to digest fodder sprouts easier and more resourcefully than grain, improving feed efficiency, milk and meat production. Reduce 50% need of grass.

Which grains are good for feudal system
White sorghum, Barley, Wheat, Sun flower, Alfalfa and other seeds.

Preparation instruction

- 1- Put the seeds in the bucket and wash it up to three times with clean water.
- 2- Mix 3ml Chlorine, Sodium Hypochloride (Bleach) or hydrogen peroxide in 2kg seeds and put it in cloth cover bucket for fifty minutes then clarify it with clean water.
- 3- Put three pack water in one pack seed and keep it for 12 hours.
- 4- Raines the seeds again and keep it dry for 48 hours
- 5- Spread about one cm thick seeds in system trays
- 6- Fill the irrigation bowl everyday morning and evening same time.

Note: The Automatic system is watering automatically and will grow in one week.

د "اوبکرنې" يا "هايډرو پونيک" له لارې څارويو ته له غلودانو د سمنک په ډول واښه کول د لېوال واښگر ل ۱ په مرسته د څارويو لپاره اړين خوراک په اوو ورځو کې برابرېږي. چې اقتصادي، اسانه او څارويو لپاره ډېر گټور دی.

د واښتگر گټې

واښه په لېوال واښگر ل ۱ کې د څرخاي په ډول زرغونېږي او وده کوي. څاروي دا تازه تېغنی وهلي واښه د وچو وښو او غلودانو په پرتله په ښه ډول خوري او هضموي چې د غوښې او شيدو ورکونکو څارويو او مرغانو لپاره غوره دي. اوبکرنې واښه پنځوس سلنه د وښو اړتيا کموي.

کوم تخمونه د واښگر لپاره غوره دي

باجره، اوربشي، غنم، لمرگل، شوتله، ريشکه او داسې نور تخمونه

تگلاره

- 1- تخم په يوه لوبني کې واچوئ او په پاکو اوبو يې درې ځلي ووښخئ.
- 2- هر دوه گيلو تخم کې لپاره درې ميلي ليتره کلورين، سوډيم هايپوکلورايډ (بليچ) يا هايډروجن پروکسايډ واچوئ او د پنځوسو دقيقو لپاره يې په پوښلي لوبني کې کېږدئ بيا يې په پاکو اوبو ووښخئ.
- 3- وروسته په يو برابر تخم کې درې برابر اوبه واچوئ او د دولسو ساعتو لپاره يې خيسته کړئ.
- 4- له تخمه پاتې اوبه وښيځئ او د اته څلوېښت ساعتو لپاره تخم وچ وساتئ.
- 5- وروسته تخم د واښگر په پتنوس کې د گوتې د نيم بند په انداز د يا کم خپاره کړئ
- 6- هره ورځ سهار او ماښام د واښگر پورتن برخې اوبخور لوبني له اوبو ډک کوئ او لاندي لوشي اوبه خالي کوئ که ډک وي.

يادونه: که خپلچار واښگر ولرئ دا چار پخپله ترسره کوي ډول اوبه ورکوي په يوه اونۍ کې به وده وکړي.